

Scoring Selective Mutism Questionnaire - Nederlandse vertaling (SMQ-NL)

De SMQ van Bergman et al. (2008) heeft als meetpretentie de ernst en symptomen van selectief mutisme (SM) in kaart brengen bij kinderen en jongeren (3-17 jaar). De SMQ is door Max Güldner naar het Nederlands vertaald. In het onderaan vermeldde artikel (Rodrigues Pereira et al., 2022) staan de resultaten van de validatiestudie naar deze Nederlandse vertaling (SMQ-NL) uitgebreid beschreven. Uit dit onderzoek van Levvel (voorheen De Bascule) bleek dat de SMQ-NL een betrouwbaar en valide instrument is voor screening op en klinische beoordeling van selectief mutisme. Hierbij is in een klinische en algemene steekproef een cut-off score (13) bepaald om vroegsignalering en tijdige doorverwijzing naar specialistische zorg te bespoedigen.

De SMQ-NL is een ouder rapportage vragenlijst, die het spreekgedrag en symptomen van selectief mutisme van het kind in verschillende situaties in kaart brengt. De SMQ bestaat uit twee schalen:

- een symptoomschaal (17 items)
- een belemmeringsschaal (6 items)

Binnen de symptoomschaal worden verschillende situaties uitgevraagd waarin een kind wordt verwacht te spreken, verdeeld over drie domeinen: school (6 items), familie/gezin (6 items) en sociale/publieke situaties (5 items).

De symptoomschaal wordt gescoord op een vierpuntsschaal (0 = altijd, 1 = vaak, 2 = soms, 3 = nooit). Een hogere score wijst op meer selectief mutisme symptomen.

De belemmeringsschaal wordt gescoord op een vierpuntsschaal (0 = geen, 1 = matig, 2 = behoorlijk, 3 = zeer veel). Een hogere score wijst op meer belemmering voor het kind en gezin door de selectief mutisme symptomen.

	Itemnummers	Score range
Symptoomschaal (17 items)		0 - 51
School (6 items)	1 - 6	0 - 18
Familie/gezin (6 items)	7 - 12	0 - 18
Sociale/publieke situaties (5 items)	13 - 17	0 - 15
Belemmeringsschaal (6 items)	1 - 6	0 - 18

De totaalscore van de SMQ-NL wordt berekend door de itemscores van de symptoomschaal bij elkaar op te tellen. Alleen op item 12 kan ook 'Niet van toepassing' worden geantwoord. Wanneer er dit het geval is kan de totaalscore berekend worden door de gemiddelde itemscore te vermenigvuldigen met het totaal aantal items (17).

*Bijvoorbeeld: de somscore van de 16 ingevulde items levert een score van 18 op. De gemiddelde itemsscore is dan $18 / 16 = 1,125$. De totaalscore wordt dan deze gemiddelde itemscore van 1,125 maal het totaal aantal items van 17, oftewel $1,125 * 17 = 19,125$, afgerond 19.*

Cut-off

Bij een score van 13 of hoger op de symptoomschaal is het advies om specialistische diagnostiek naar selectief mutisme, en indien nodig behandeling, in te zetten.

Referenties

- Bergman, R. L., Keller, M. L., Piacentini, J., & Bergman, A. J. (2008). The development and psychometric properties of the selective mutism questionnaire. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 37(2), 456-464.
- Rodrigues Pereira, C., Ensink, J.B.M., Güldner, M. G., Kan, K. J., De Jonge, M. V., Lindauer, R.J.L., & Utens, E.M.W.J. (2022). The Validation of the Selective Mutism Questionnaire for Use in the Dutch Population. *Child Psychiatry & Human Development*, 1-12.